

**WUXAL® TOP P****HNOJIVO ES**

**Typ hnojiva:** C.2.1 Hnojivo NPK roztokové 5-20-5 se stopovými živinami

**Obsah živin:**

% hmotnostní	živina
5,0	Dusík (N) celkový
5,0	- amonný dusík
20,0	vodorozpustný oxid fosforečný (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
5,0	vodorozpustný oxid draselný (K <sub>2</sub> O)
0,01	vodorozpustný bór (B)
0,004	vodorozpustná měď (Cu) v chelátu s EDTA
0,02	vodorozpustné železo (Fe) v chelátu s EDTA
0,012	vodorozpustný mangan (Mn) v chelátu s EDTA
0,001	vodorozpustný molybden (Mo)
0,004	vodorozpustný zinek (Zn) v chelátu s EDTA

**Čistá hmotnost:** 1,3 kg láhev; 26 kg kanystr; 260 kg sud

**Výrobce:** AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstrasse 199, D-40549 Düsseldorf, Německo.

**Pokyny pro použití:**

Speciální listové hnojivo určené pro všechny intenzivně pěstované a speciální plodiny se zvýšeným požadavkem na fosfor, který nemůže být vykryt půdními hnojivy. Kromě toho přidáním dusíku, draslíku a vybraných plně chelativovaných stopových živin se předchází nevyvážené výživě pěstovaných plodin. Vysoký obsah fosforu v hnojivu umožňuje rychlou úpravu akutního nedostatku P a také cílené předcházení latentního deficitu P.

Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Objem balení: 1 l láhev; 20 l kanystr; 200 l sud

**Dávkování a podmínky používání:**

plodina	dávka	poznámka
Cukrová řepa	2 - 4 l/ha	1 – 2 aplikace ve fázi od 4 listů řepy do zakrytí řádků
Kukuřice	4 l/ha	1 – 2 aplikace ve fázi 2 – 6 listů kukuřice
Ovocné stromy	3 l/ha *)	3 – 4 aplikace od fáze poupat až do fáze plodu velikosti „oříšku“ *) aplikace v intervalu minimálně 8 – 10 dnů 4 – 5 aplikace od počátku léta
Réva vinná	2 l/ha	2 – 3 aplikace v období od tvorby bobulí do fáze zaměkání bobulí
Zelenina	4 l/ha	3 – 4 aplikace v období intenzivního růstu kultur

**Mísitelnost, příprava postřiku:**

Wuxal top P je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin, přesto doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti před začátkem aplikace.

Při ředění je nutno zachovávat následující postup.

1. Do nádrže dát cca. ¾ množství vody.
2. Zapnout míchání.
3. Přidat odměřené množství přípravku. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže.
4. Poté eventuálně přidat pesticidní přípravky.
5. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem
6. Připravenou jichu je nutno co nejrychleji vystříkat, nelze ji připravovat do zásoby.

### **Pokyny pro skladování a manipulaci:**

Produkt je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte před znečištěním, vysušením a před mrazem, teplotami pod  $-5^{\circ}\text{C}$  a nad  $+40^{\circ}\text{C}$ . Zajistěte, aby v průběhu skladování nedocházelo k většímu kolísání teplot.

### **Bezpečnostní opatření:**

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

### **První pomoc:**

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

#### **Při nadýchání aerosolu při aplikaci:**

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.

#### **Při zasažení kůže:**

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Při zasažení očí:**

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky pokud je postižený používá před ošetřením oka odstraňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.

#### **Při náhodném požití:**

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**Distributor:** AGRO ALIANCE, s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 138.

### **OZNAČENÍ:**

Směs není označená jako nebezpečná dle Nařízení 1272/2008 ES (CLP)