


**PŘÍKLADY PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ HERBICIDŮ FIRMY AGRO ALIANCE
V CUKROVCE**

Program		
č. 1	Běžné zaplavení – ÚSPORNÝ PROGRAM	
T1	Fenifan + Stemat Super + Gondor	2,5 + 0,15 + 0,2 l/ha
T2	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Gondor	1,0 + 1,5 + 30 g + 0,2 l/ha
T3	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Gondor	1,5 + 1,0 + 30 g + 1,5 + 0,2 l/ha
č. 2	Běžné zaplavení + VÝDROL ŘEPKY, laskavce, rdesna, tetlucha	
T1	Fenifan + Stemat Super + Topkat + Shiro + Gondor	2,5 + 0,2 + 0,3 + 20 g + 0,2 l/ha
T2	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Topkat + Gondor	1,0 + 1,5 + 30 g + 0,5 + 0,2 l/ha
T3	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Topkat + Gondor	1,5 + 1,5 + 30 g + 1,0 + 0,5 + 0,2 l/ha
č. 3	Běžné zaplavení + výdrol řepky, laskavce, rdesna, tetlucha + TRÁVOVITÉ plevele	
T1	Fenifan + Stemat Super + Topkat + Shiro + Gondor	2,5 + 0,2 + 0,3 + 20 g + 0,2 l/ha
T2	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Topkat + Gondor	1,0 + 1,5 + 30 g + 1,0 + 0,6 + 0,2 l/ha
T3	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Topkat + Gondor	1,5 + 1,5 + 30 g + 1,5 + 0,6 + 0,2 l/ha



Poznámka: T1 plevelé ve stádiu děložních listů bez ohledu na vývojové stádium řepy
 T2 druhá aplikace za 5–9 dní po vzejití další vlny plevelů, plevelé musí být ve stádiu děložních listů
 T3 třetí aplikace po vzejití další vlny plevelů

Dávka vody: 150–200 l/ha podle přípravků nebo jejich kombinací